

La flore et la faune des champs

Les champs nous permettent d'observer une flore et une faune différentes de celles des milieux humides, des sous-bois et des forêts. Si la lutte pour l'occupation de chaque centimètre carré est vive entre les variétés, les plantes n'en bénéficient pas moins d'un ensoleillement qui favorise leur épanouissement. De la fonte des neiges à tard l'automne, une abondante floraison tapisse nos champs et offre un merveilleux spectacle à l'observateur attentif.


Une faune spécifique à ce milieu y trouve refuge et nourriture. On n'y rencontre pas d'animaux de grande taille mais une infinité d'espèces qui participent à l'équilibre de cet écosystème.

Bruant familier

Spizella passerina

Longueur : 11-14 cm.

Traits : calotte marron; rayure noire derrière l'œil; dessous gris clair; juvénile à tête et dessous rayés. Habitat : boisés clairsemés, orée des forêts, champs en friche, terres agricoles, vergers, parcs.



Abeille domestique

Apis mellifera

Longueur : 1,5-3 cm.

Traits : corps effilé et velu; généralement fauve marqué de noir; corbeilles à pollen sur les pattes postérieures. Habitat : arbres creux, ruches.



Campagnol des champs (mulot)

Microtus pennsylvanicus

Longueur : tête et corps 9-13 cm; queue 4-6 cm.

Traits : dos et flancs bruns ou brun foncé; abdomen gris. Habitat : champs à hautes herbes, vergers, orée des bois.



Fourmi

Formicidae

Longueur : 0,2-2 cm.

Traits : corps généralement noir sans ailes, sauf en période de reproduction; abdomen joint au thorax par un segment étranglé à protubérance, visible chez les grands sujets; antennes recourbées; structure sociale complexe. Habitat : partout, sauf en régions très froides.



Fraisier sauvage

Fragaria virginiana

Taille : 5-25 cm; fleur 1,5-2 cm de diamètre.

Traits : feuilles trifoliées, velues; fleurs blanches; baies rouges. Habitat : prés, clairières. Floraison : mai-juin.



Écureuil gris de l'Est

Sciurus carolinensis

Longueur : tête et corps 20-28 cm; queue 20-25 cm

Traits : dos et flancs gris, abdomen blanchâtre (on trouve des sujets tout noirs); grosse queue touffue. Habitat : forêts de feuillus, champs, parcs urbains.



Grillon

Acheta domestica

Longueur : 1,5-2,5 cm.

Traits : brun foncé ou noir; longues antennes; pattes arrières très longues; ailes supérieures coriaces chez la femelle, minces et transparentes chez le mâle. Habitat : champs, broussailles, jardins.



Petite herbe à poux

Ambrosia artemisiifolia

Taille : 30 cm-1,5 m; fleur 3 mm de diamètre.

Traits : fleurs verdâtres en épis élançés (mâles) ou bouquets axillaires (femelles); feuilles très lobées, échanquées; tiges velues, ramifiées. Le pollen des fleurs mâles est responsable de la fièvre des foins. Habitat : champs, prés, bords de route, friches. Floraison : juillet à octobre.



Mouffette rayée

Mephitis mephitis

Longueur : tête et corps 38-48 cm; queue 18-25 cm.

Traits : rayure faciale blanche; rayure blanche en V sur le dos; queue touffue bicolore. Habitat : bois peu denses, régions agricoles, champs en friche et prairies; même en région urbaine.



Tanaisie vulgaire

Tanacetum vulgare

Taille : 30 cm-1 m; fleur 0,6-1,5 cm de diamètre.

Traits : capitules jaunes en boutons réunis en bouquets plats au sommet d'une tige dressée; feuilles découpées, dentées. Habitat : champs, friches, bords de route. Floraison : juillet à octobre.



Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Longueur : 18-22 cm.

Traits : bec long et pointu; queue courte et carrée; plumage noir à reflets verts et pourpres, tacheté en hiver; juvénile brun à dessus plus sombre. Habitat : terres agricoles, champs, boisés, parcs urbains.



Hirondelle des granges

Hirundo rustica

Longueur : 14-18 cm.

Traits : queue très fourchue; dessus bleu sombre et luisant; dessous roux clair; gorge plus foncée. Habitat : bois clairsemés, terrains dégagés, fermes, bâtiments.



Sauterelle verte

Tettigoniidae

Longueur : 1,5-7,5 cm.

Traits : gros corps vert ou brun pâle; pattes arrières très longues; longues antennes; larges ailes, en toit sur le corps au repos. Habitat : bois, champs, broussailles, pelouses.



Mille-pattes

Diplopoda

Longueur : 2,5-12,5 cm.

Traits : corps vermiforme; segments à 2 paires de pattes; antennes courtes; démarche lente. Habitat : lieux humides, sous les roches, bois, feuilles.



Moutarde noire

Brassica nigra

Taille : 50 cm-1 m; fleur 1,5-2 cm de diamètre.

Traits : fleurs jaune vif en grappes sur tiges ramifiées; feuilles rugueuses, lobées, découpées à la base. Habitat : champs, prés, bords de route. Floraison : juin à octobre.



Linaira vulgaire

Linaria vulgaris

Taille : 15-90 cm; fleur 2,5 cm de long.

Traits : fleurs jaunes à éperon, tachées d'orange à la gorge, en épis terminaux; tiges à feuilles linéaires. Habitat : champs, friches, bords de route. Floraison : juin à septembre.



Aster de Nouvelle-Angleterre

Aster novæ-angliæ

Taille : 50 cm-1,5 m; fleur 2,5-5 cm de diamètre.

Traits : capitules à ligules violettes entourant un disque jaune, en bouquets sur pédoncules velus et collants; feuilles lancéolées engainant la tige. Habitat : prés, bords de route. Floraison : juillet à octobre.



Gros-bec errant

Coccothraustes vespertina

Longueur : 18-20 cm.

Traits : bec très fort, conique, pâle; mâle jaune-brun; queue noire; ailes blanc et noir; femelle grisâtre. Habitat : forêts de conifères et de feuillus, boisés, champs.



Cardinal

Cardinalis cardinalis

Longueur : 18-22 cm.

Traits : huppe voyante; bec conique rougeâtre; mâle rouge vif à plastron et pourtour des yeux noirs; femelle brun-jaune à huppe, ailes et queue teintées de rouge. Habitat : bois clairsemés, orée des forêts, parcs, champs en friche, jardins.



Chardonneret jaune

Carduelis tristis

Longueur : 10-13 cm.

Traits : mâle jaune vif; front, ailes et queue noirs; femelle à dessus vert olive, dessous plus clair; les deux brun-jaune en hiver; vol ondulé. Habitat : terres agricoles, bosquets, parcs.



Coccinelle (bête à bon Dieu)

Coccinella septempunctata

Longueur : moins de 9 mm.

Traits : corps rouge ou noir à marques contrastantes; abdomen et tête souvent dissimulés par les ailes supérieures et le prothorax, faisant paraître la bête ronde. Habitat : forêts, broussailles, prés, jardins.



Matricaire odorante

Matricaria matricarioides

Taille : 10-40 cm; fleur 6 mm de diamètre.

Traits : capitules jaunes, sphériques, au sommet des rameaux feuillus; feuillage très découpé, à odeur d'ananas. Habitat : champs, friches, bords de route, voies ferrées. Floraison : juin à septembre.



Mélicot blanc (trèfle d'odeur)

Melilotus alba

Taille : 50 cm-2,5 m; fleur 6 mm de long.

Traits : fleurs blanches odoriférantes en épis denses terminaux ou entre les feuilles; port buissonnant; 3 petites folioles dentées. Habitat : champs, prés, friches. Floraison : juin à octobre.



Bouton d'or

Ranunculus acris

Taille : 30-90 cm; fleur 2-2,5 cm.

Traits : fleurs cireuses, jaune vif; tiges ramifiées et ailes; feuilles dentées de 3 à 7 segments. Habitat : prés, bords de route. Floraison : mai à septembre.



Merle d'Amérique (rouge-gorge)

Turdus migratorius

Longueur : 23-28 cm.

Traits : dessus gris-brun; tête plus claire; petites taches blanches près des yeux; dessous rouge brique et bas ventre blanc; bout de la queue blanc; juvénile à poitrine plus claire et tachetée. Habitat : bois clairsemés, terres agricoles, parcs urbains, endroits abrités à arbres fruitiers en hiver.



Cornille d'Amérique

Corvus brachyrhynchos

Longueur : 40-50 cm.

Traits : corps noir luisant; bec, pattes et pieds noirs; ailes et queue arrondies. Habitat : forêts et clairières, terrains découverts, terres agricoles, parcs.



Belle-dame et vulcain

Vanessa cardui, Vanessa atalanta

Envergure : 4-6 cm.

Traits : coloris vif; bout des ailes antérieures noir maculé de blanc; bord non dentelé. Habitat : bois peu denses, prés, champs en friche.



Rat surmulot (rat d'égout)

Rattus norvegicus

Longueur : tête et corps 18-25 cm; queue 14-20 cm.

Traits : pelage rude, gris-brun terne; abdomen plus clair; queue longue, écaillée, presque sans poils, d'une seule teinte. Habitat : dépotoirs, champs, villes, édifices.



Marmotte commune

Marmota monax

Longueur : tête et corps 36-50 cm; queue 11-18 cm.

Traits : tête large; corps trapu; membres courts; petite queue touffue. Habitat : forêts peu denses, terrains rocheux, clairières, bords de route.



Vipérine vulgaire

Echium vulgare

Taille : 30-75 cm; fleur 1,5-2 cm de diamètre.

Traits : fleurs bleues à longues étamines rouges venant d'un seul côté d'un pédoncule vrillé au sommet d'une tige sétifère; feuilles velues, oblongues ou lancéolées. Habitat : champs, friches, bords de route. Floraison : juillet à septembre.

